

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

при эпилептическом приступе



приступы, НЕ сопровождающиеся
генерализованными судорогами

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

при эпилептическом приступе

1. Основные симптомы эпилептического приступа

- Отсутствующий взгляд в пространство
- Жевательные движения
- Перебирание одежды
- Бесцельное блуждание
- Подергивание конечностей
- Затрудненная речь



2. Первая помощь при развитии приступа

- Установить продолжительность приступа
- Разговаривать спокойно
- Не поднимать и не удерживать больного
- Объяснить остальным, что случилось
- Не поддаваться панике



Люди с подобным типом приступов должны полностью прийти в сознание и отдавать себе отчет в происходящем, прежде чем Вы оставите их одних.

Убедитесь в том, что они ориентируются во времени и в пространстве и имеют представление о том, что будут делать дальше. Замешательство после приступа может длиться дольше, чем приступ и может привести к негативным последствиям.

Если сознание полностью не возвращается, вызовите экстренную помощь (скорую помощь).

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

при эпилептическом приступе



приступы, сопровождающиеся
генерализованными судорогами

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

при эпилептическом приступе

- Не пытайтесь поместить в рот человеку какой-либо предмет.
- Постарайтесь найти у него медицинское заключение/сведения о заболевании.
- Положите его голову на ровную и мягкую поверхность.
- Засеките время продолжительности приступа.
- Ослабьте галстук или другие предметы одежды, которые могут затруднить дыхание.
- Не пытайтесь его удержать.
- Поверните его на один бок.
- По окончании приступа, предложите свою помощь.



Большинство приступов не представляют собой экстренной ситуации. Они делятся всего несколько минут, не причиняют особого вреда пациенту и не требуют обращения в стационар. Однако в определенных случаях следует обратиться за экстренной помощью. Так, например, приступ у тех, кто ранее не страдал эпилепсией, может свидетельствовать о серьезном заболевании.

Другие случаи, при которых следует обратиться за экстренной медицинской помощью - приступ длится более 5 минут;

- Отсутствие эпилепсии и эпилептического расстройства в истории болезни;
- Медленное восстановление после приступа, вторичный приступ или затрудненное дыхание после приступа;
- Беременность или наличие других медицинских диагнозов;
- Любые признаки физического повреждения после приступа;